


Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 26. 9. 2003 et incidence par 1000 consultations (N/10³)
 Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	36		37		38		39		Moyenne de 4 semaines	
Thème	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Suspicion de grippe	12	0.7	14	0.7	20	1.1	26	1.6	18	1
Crise d'asthme	22	1.2	15	0.8	31	1.7	12	0.7	20	1.1
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéole	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Oreillons	0	0	0	0	1	0.1	2	0.1	0.8	0
Coqueluche	2	0.1	4	0.2	4	0.2	5	0.3	3.8	0.2
Otite moyenne	49	2.8	31	1.7	59	3.2	64	4	50.8	2.9
Pneumonie	7	0.4	11	0.6	17	0.9	9	0.6	11	0.6
Influenza,										
Pneumocoques: vaccination	6	0.3	69	3.7	293	16	302	18.8	167.5	9.7
Médecins déclarants	208		208		197		165		194.5	

Données provisoires

Déclarations Sentinella juin 1986–août 2003

La rubéole



La vaccination généralisée des petits enfants contre les ROR (rougeole, oreillons et rubéole) a été introduite en Suisse en 1985. En 1987, l'Office fédéral de la santé publique

(OFSP) a initié une campagne pour promouvoir cette vaccination. Quelques années plus tard, on a assisté à une baisse sensible et durable de l'incidence de la rubéole en Suisse

(voir figure). La tendance s'inscrit toujours à la baisse, mais faiblement depuis 1998. Sur la base des cas cliniques déclarés par les médecins Sentinella, nous estimons à

environ 1800 le nombre de cas de rubéole pour la Suisse en 1998, à 1400 en 1999, à 1200 en 2000 et 2001, et à 900 en 2002, pour un maximum d'environ 10 800 cas cliniques en 1989. L'incidence estimée des cas cliniques de rubéole a diminué de 25 pour 100 000 habitants en 1998 à 12/100 000 en 2002.

Selon des données encore provisoires, 14 cas cliniques de rubéole ont été déclarés durant les 8 premiers mois de l'année 2003, soit environ la moitié moins que pour la même période de 2002. La tendance à la baisse semble donc se poursuivre en 2003, voire se renforcer puisqu'habituellement une majorité des cas sont rapportés durant le premier semestre. Environ un cinquième de ces cas avaient moins de 1 an et 85% moins de 13 ans. Deux cas ont été déclarés chez les adultes (deux hommes de 38 et 45 ans) et aucun chez les adolescents. Presque quatre cinquièmes des cas sont de sexe masculin. Aucun cas rapporté n'a eu de complications ni n'a été hospitalisé. Un examen sérologique a été effectué pour six cas sur 14. Aucun d'entre eux n'était positif (deux tests IgM négatifs pour un cas et un seul test négatif pour les cinq autres, ce qui ne permet pas de les exclure avec certitude). La moitié des cas étaient vaccinés.

En 2000–2002, la couverture vaccinale contre la rubéole des enfants de 24 à 35 mois était de 79%. Pour au moins une dose, elle s'élevait à 88% chez les enfants de 5 à 7 ans et à 92% chez les adolescents de 16 ans. Or, il est nécessaire que 85 à 87% de la population soit immune pour bloquer la circulation du virus. Pour réduire le nombre de cas et éliminer la rubéole congénitale en Suisse, l'OFSP recommande la vaccination de tous les jeunes enfants selon le calendrier suivant: première dose ROR à 12 mois, deuxième dose entre 15 et 24 mois, au plus tôt 1 mois après la première dose. Une vaccination manquante peut être rattrapée à n'importe quel âge. Pour les jeunes adultes non vaccinés qui n'auraient pas eu avec certitude la maladie pendant leur enfance la vaccination est également recommandée, en particulier pour les femmes en âge de pro-

créer, le personnel médical et pour ceux qui travaillent avec des enfants. ■

Office fédéral de la santé publique
Division épidémiologie et
maladies infectieuses