

Statistique Sentinella

Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 8. 6. 2007 et incidence par 1000 consultations (N/10³)


Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	20		21		22		23		Moyenne de 4 semaines	
Thème	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Suspicion de grippe	6	0.4	6	0.3	11	0.8	4	0.3	6.8	0.5
Rougeole	0	0	2	0.1	2	0.1	0	0	1	0.1
Rubéole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oreillons	0	0	1	0.1	1	0.1	0	0	0.5	0
Coqueluche	2	0.1	1	0.1	2	0.1	0	0	1.3	0.1
Otite moyenne	34	2.3	56	3.3	38	2.8	44	3.1	43	2.9
Pneumonie	14	0.9	13	0.8	15	1.1	16	1.1	14.5	1
Gastroentérite aiguë	32	2.1	41	2.4	35	2.5	43	3	37.8	2.5
Médecins déclarants	175		171		170		151		166.8	

Données provisoires

Déclarations Sentinella juin 1986–mai 2007

Les oreillons



Depuis la mise en place du système de surveillance Sentinella en 1986, deux importantes épidémies d'oreillons ont été enregistrées en Suisse,

en 1994–1995 et en 1999–2000. A partir des déclarations des médecins Sentinella, le nombre de cas d'oreillons était estimé à environ

50 000 en 1995. Il se montait à 17 000 en 1999 et à 28 000 en 2000. Depuis lors, le nombre de cas d'oreillons traités dans un cabinet

médical s'inscrit nettement à la baisse: 10 000 en 2001, 2700 en 2002, 1600 en 2003, 1300 en 2004 et 1000 en 2005, soit le plus bas niveau jamais enregistré par Senti-nella. L'estimation du nombre total de cas pour 2006 n'a pas encore pu être calculée. Elle devrait cependant confirmer la tendance à la baisse de ces dernières années.

En 2006, 31 cas d'oreillons ont été rapportés par des médecins déclarant régulièrement (42 en 2005). Un résultat de laboratoire était disponible pour 25 (81%) d'entre eux, dont seulement trois (12%) étaient positifs. De plus, la définition clinique de cas n'était pas attestée pour 52% des cas (données manquantes, absence de tuméfaction de la parotide ou d'autres glandes salivaires, ou encore durée de la tuméfaction inférieure à 2 jours). En outre, un seul cas d'oreillons (avec une sérologie positive) était en lien épidémiologique avec un autre cas. Comme attendu en dehors des épidémies, la plupart des suspicions d'oreillons rapportées n'étaient donc probablement pas dues au virus ourlien.

De janvier à mai 2007, 8 cas ont été déclarés (données provisoires), contre 12 pour la même période de l'année précédente. Aucun des 5 cas pour lesquels un résultat de laboratoire était disponible en 2007 n'était confirmé. Il est donc probable que, comme les 5 années précédentes, une proportion élevée des cas rapportés n'étaient pas des oreillons.

En 1999–2003, la couverture vaccinale contre les oreillons des enfants de 2 ans était de 81%, pour au moins une dose. Elle s'élevait à 87% chez les enfants de 5 à 8 ans (36% pour deux doses) et à 93% chez les adolescents de 14 à 16 ans (53% pour deux doses). Selon une nouvelle enquête menée dans 16 cantons en 2005–2006, la couverture vaccinale s'inscrit à la hausse pour les oreillons, passant à 85% pour au moins une dose à 2 ans et atteignant 69% à 75% pour la seconde dose, selon l'âge. L'Office fédéral de la santé publique recommande la vaccination de tous les jeunes enfants, selon le calendrier du plan de vaccination: première vaccination ROR (rougeole, oreillons, rubéole) à l'âge de 12 mois,

suivie d'une deuxième dose à l'âge de 15 à 24 mois. Une vaccination manquante peut être rattrapée à n'importe quel âge. Pour les jeunes adultes non vaccinés ou sans immunité prouvée, la vaccination ROR est également recommandée, en particulier pour le personnel médical et pour ceux qui travaillent avec des enfants. ■

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 031 323 87 06